



IBR?

HAYIR TEŞEKKÜRLER!



BOVILIS

IBR MARKER inac



IBR eradikasyonu: bir adım daha yakın

IBR NEDİR?

İnfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis (IBR), Sığır Herpesvirus Tip 1'in neden olduğu bir enfeksiyondur. IBR; üst solunum yollarını etkileyen bir solunum enfeksiyonu olup, abort, infertilite ve süt veriminde düşüslere yol açar.

IBR ERADİKASYONU NEDİR?

IBR eradikasyon programlarının amacı BoHV-1'den ari sığır popülasyonu elde etmektir. Enfeksiyon sonrası virus latent olarak kaldığından, BoHV-1'e karşı şekillenen antikorların bulunduğu tüm hayvanlar enfekte olarak tanımlanır. Sero-pozitif bu hayvanların sürüden çıkarılması, virusun sürüden eliminasyonunu sağlar. Ekonomik nedenlerden dolayı "test et ve sürüden çıkar" yaklaşımı, en mantıklı çözümdür. Eradikasyon programının diğer önemli bir ayağı ise marker aşılar kullanmaktır.

ERADİKASYON PROGRAMI UYGULAYANLAR?

Norveç, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Avusturya ve İtalya (Bolzano bölgesi) gibi Avrupa ülkeleri, IBR ari ülke statüsündedirler. Diğer bazı Avrupa ülkelerinde ise IBR eradikasyon programları resmi olarak uygulanmaya başlamış ve halen sürdürülmektedir.


**BOVILIS
IBR MARKER
INAC**

Bovilis IBR marker inac: IBR mücadelesinde yeni güç

Bovilis IBR marker inac; çok iyi bilinen GK/D suşu kullanılarak geliştirilmiştir.

Yapılan deneysel çalışmalarda; anneden maternal antikor almamış buzağılarda uygulanan aşının, klinik semptomları ve virus saçımını azalttığı görülmüştür.

İlk doz aşı uygulamasını takiben yapılan rapel doz sonrasında, oldukça yüksek bir antikor seviyesi şekillendiği yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir.



PET şişe kullanımı; şişenin kırılması vb nedenler ile olabilecek kontaminasyonu engellediğinden, aşı güvenliğini en üst düzeye çıkarmaktadır.

Bovilis IBR marker inac: Aşı programı

Aşı programına başlangıç, her çiftliğin epidemiyolojik durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Genç hayvanlarda (virüs sirkülasyonunun olmadığı şartlarda) aşı programına 3 aylık yaştan itibaren başlanmalıdır. Rapel doz, ilk uygulamadan 4 hafta sonra yapılmalıdır.

Her 6 ayda bir tekrar aşılama yapılmalıdır.

İLK AŞI UYGULAMASI: 3 AYLIK VEYA DAHA YAŞLILAR

3 AYLIK	4 AYLIK	HER 6 AYDA TEKRAR
Bovilis IBR marker inac IM	Bovilis IBR marker inac IM	Bovilis IBR marker inac IM



Yüksek immünojenik GK/D suşu

Kas içi uygulama

Klinik semptomları ve virus saçımını azaltır

Yüksek güvenlik profili

Kolay kullanılan PET şişe

BİLEŞİMİ

Bir doz aşı (2 ml), potens testinde 6.1-11.1 log₂ virüs nötralizan (VN) üniteyi indükleyen, 60 ELİSA ünitesi BHV-1 GK/D inaktif suşu içermektedir. Adjuvan olarak alüminyum hidroksit ve alüminyum fosfat içermektedir. Yardımcı madde olarak ise formaldehit eklenmiştir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Siğirilerde BHV-1 enfeksiyonu sonucu meydana gelen klinik bulguların (pireksi) süresi ve yoğunluğunun azaltılmasının yanı sıra saha virüsünün replikasyon ve nazal saçılımını azaltmak amacıyla siğirilerin aktif immunizasyon için kullanılmaktadır.

Bağışıklığın başlaması: temel aşılamadan 3 hafta sonra

Bağışıklığın süresi: temel aşılamadan 6 ay sonrasına kadar

KONTRENDİKASYONLAR/UYARILAR/YAN ETKİLER

Kontrendikasyonu bulunmamaktadır. Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır. Maternal antikorlar açısından etkinliği kanıtlanmamıştır. Yanlışlıkla kişinin kendine enjekte etmesi durumunda tıbbi destek sağlanmalı ve aşı etiketi veya prospektüsü doktora gösterilmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ

Her hayvan için 2 ml kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanır.

3 aylık ve daha büyük tüm siğiriler aşılanabilir.

Temel Aşılama:

4 hafta ara ile iki enjeksiyon

Tekrar Aşılama:

Her 6 ayda bir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA

UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s):); Yoktur

MUHAFAZA ŞARTLARI

Aşı 2-8°C'de muhafaza edilmeli ve ambalajında belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

Dondurulmaz.

KULLANIM SONU İMHA

Aşılamadan sonra eller ve ekipman yıkayıp dezenfekte edilmelidir. Artan aşı yakılarak ya da kaynatılarak imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

5, 10, 25, 50 veya 100 dozluk 1 veya 10 şişe kalın karton kutularda sunulmaktadır.

Intervet Veteriner İlaçları

Paz. ve Tic. Ltd. Şti

Şişli Ayazağa Yolu No:3

Çelik İş Merkezi B Blok Kat:1

Ayazağa 34396 / İSTANBUL

Tel +90 212 332 1111

Fax +90 212 332 1117

E-mail info@intervet.com